

Schaf-/Ziegenhaltung

Besatzdichte/Fressplatzbreite

	Liegefläche (m ²)	Fressplatzbreite (m)
Mutterschaf bis 70 kg	0,80	0,40
Mutterschaf über 70 kg	1,00	0,45
Mutterschaf mit Lamm	1,00 plus 0,25 pro Lamm	0,50
Mastlamm	0,45	0,20
Jährling (Zutreter)	0,65	0,30
Zuchtbock (Einzelbucht)	3,00 bis 4,00	0,60
Zuchtbock (Gruppenhaltung)	2,00	0,50

Schur

Alle Wollrassen müssen einmal im Jahr geschoren werden. Empfehlung: Bei Winterstallhaltung vor dem Aufstallen; bei Freilandhaltung im Zeitraum von April bis Juni.

Tränke

Wasser soll ständig zur freien Aufnahme zur Verfügung stehen.
Wasserbedarf pro ausgewachsenes Tier ca. 1,5 - 4 l; in Hitzeperioden bis 7 l.

Ablammen

Ablammen in der kalten Jahreszeit im Stall; steht ein solcher nicht zur Verfügung ist ein Witterungsschutz vorzusehen, der sauber, trocken und windgeschützt ist.

Freilandhaltung

Bei Freilandhaltung ist in der kalten Jahreszeit ein trockener, gegen Niederschläge und Wind geschützter Liegebereich zur Verfügung zu stellen. Alle Tiere müssen gleichzeitig liegen können → Richtwert: 0,50m²/Tier.

In den warmen Monaten ist ein Sonnenschutz zu stellen.

Einzäunung

Die alleinige Einzäunung mit Stacheldraht ist unzulässig.